

donc bien militer en faveur de la validité spécifique du *M. neglectus*, et je proposerai de cataloguer ainsi, à la suite du *M. dispar*, cette espèce pœcilygne :

Multhodes neglectus Muls., Mollipennes. 1862. p. 397;
 Bourg., Faune gallo-rhén., p. 192. — *decorus* Bourg.,
Bull. Soc. ent. Fr. [1903], p. 336. — Suisse; Alpes fran-
 çaises; Provence; Ligurie; Abruzzes.
 v. ♀ (apt.) *Putoni* Bourg., *Bull. Soc. ent. Fr.* [1902], p. 182.
 — Splügen.

OBSERV. — Ne connaissant pas en nature les variétés du *M. dispar* décrites par M. Fiori sous les noms de *decoloratus* et de *nigrinus* (Riv. Col. Ital., n° 12, 1905, p. 250), je ne saurais dire si elles sont à rattacher à cette espèce ou au *neglectus*. Toutefois *decoratus*, des Apennins d'Émilie, me paraît devoir être plutôt rapporté à *neglectus*.

Les sous-variétés de *Crioceris macilenta* Weise [COL.]

(deuxième note)


par le D^r A. CHABAUT.

A peine paru, l'article que j'ai publié ici même sur les sous-variétés de *Crioceris macilenta* Weise (*Bull. Soc. ent. Fr.* [1907], pp. 177-179) a déjà besoin de retouches.

Sur la foi du travail de M. le P^r L. von Heyden (*Wiener entom. Zeitung* [1906], pp. 125-126) et des auteurs de la dernière édition du *Catalogus Coleopt. Europae* (1906), j'avais pensé qu'aucune des sous-variétés de *Crioceris macilenta* décrites jusqu'à ce jour n'avait été omise par eux. Mais je n'avais pas pensé à M. Pic qui, dès 1897, dans une petite plaquette de 4 pages intitulée : « Variétés (2^e article) » et publiée à Lyon, avait fait connaître en quelques lignes cinq aberrations de cette espèce, et qui en a publié dernièrement une sixième (*L'Échange* [1906], p. 34). Avec son habituelle courtoisie, cet auteur me signale les omissions qui rendent mon travail incomplet. Sans vouloir discuter la valeur un peu problématique de variétés publiées dans de semblables conditions, qu'il me permette cependant de l'engager à ne plus faire éditer ses travaux en plaquettes séparées toujours difficiles à se procurer et, partant, à connaître. Il est vrai qu'il a pris la peine de cataloguer toutes ses publications. On fera

bien, à l'occasion, de se reporter à ces travaux, ainsi que j'aurais dû le faire moi-même, je le reconnais.

D'autre part, notre obligeant collègue M. L. von Heyden a bien voulu me communiquer dernièrement un type de *Crioceris* v. *hispanica* Weise, provenant de Porto ex Gabriel. De l'examen de cet insecte, il résulte que cette aberration n'appartient pas à *C. macilentata*, mais bien à *C. asparagi* L. Elle est voisine des ab. *maculipes* Gebl., Küst., et *Pici* Heyd. de *C. asparagi* et elle s'en distingue par ses tibias entièrement noirs. Donc l'aberration que j'avais appelée *hispanica* Weise n'est pas autre chose, actuellement, que *C. campestris* L.



Ceci posé, voici comment il convient de modifier mon tableau des sous-variétés de *C. macilentata* :

- 1 — Élytres bronzés avec une bande longitudinale jaune près de la bordure latérale.
- 2 — Bande longitudinale jaune étroite, non réunie en arrière à la bordure latérale. Cette bande tantôt partout de la même largeur, tantôt sinuusement rétrécie ou échancrée angulairement un peu après le milieu. Forme typique (fig. 1 et 2) (1). — Italie : Toscane (sec. Heyden). France : Nice (Peragallo)!. Corse : Ajaccio (Guglielmi, sec. Duchaine)!. Portugal : Faro (sec. Heyden). Algérie : Constantine (Bousquet)!. *macilentata* Weise.
- 2 — Bande longitudinale jaune large, réunie en arrière à la bordure latérale.
- 3 — Cette bande entière, non interrompue au milieu (fig. 3). — Espagne : Carthagène (sec. Heyden). Portugal : Faro (sec. Heyden). Algérie : Gueltes-Stel!; djebel Bou-Berack! (*iberica* Heyd.) a. *lineata* Pic.
- 3 — Cette bande, interrompue au milieu (fig. H). — Algérie (sec. Pic) a. *mediodisjuncta* Pic.

(1) Pour les 10 premières figures, voir celles de la page 177 du présent volume.

- 1' — Élytres jaunes avec une bande suturale et des taches latérales bronzées.
- 4 — Huit taches latérales bronzées, quatre sur chaque élytre (fig. 12). — Espagne : Carthagène (sec. Heyden); Chiclana (sec. Heyden)..... a. *Simoni* Weise.
- 4' — Six taches latérales bronzées, trois sur chaque élytre (fig. 4). Analogue à *C. asparagi* a. *incrucifer* Pic. — Algérie : Oran (sec. Pic); Guelt-es-Stel!. Tunisie : Tunis (D^r Schmiedeknecht, sec. Heyden); Tebour-souk (D^r Sicard)! (*sexsignata* Heyd.).... a. *Jacqueti* Pic.
- 4'' — Quatre taches latérales bronzées, deux sur chaque élytre, une à la base et l'autre vers l'extrémité (fig. 5). — Algérie : Laghonat, montagne des Chiens!. Tunisie : Tebour-souk (D^r Sicard)!..... a. *Touraierei* Pic.
- 1'' — Élytres jaunes avec une bande suturale, une fascie apicale et quatre taches latérales, deux antérieures et deux médianes, bronzées (fig. 6). Analogue à *C. asparagi* a. *4-punctata* Schuster. — Algérie : Guelt-es-Stel!...
..... a. *4-maculata* Chob.
- 1''' — Élytres bronzés avec six taches jaunes, trois sur chacun d'eux, ces taches soit isolées, soit réunies à la bordure latérale ou entre elles.
- 5 — Taches jaunes basales et médianes non réunies longitudinalement l'une à l'autre.
- 6 — Taches médianes et postérieures réunies à la bordure latérale (fig. 7). — Algérie : Constantine (Bousquet)!; Bougie!; djebel Bou-Berak!..... a. *campestris* L.
- 6' — Taches médianes et postérieures non réunies à la bordure latérale (fig. 8). Se rapproche de *C. asparagi* a. *pupillata* Ahr. — Italie : Toscane (sec. Heyden). Algérie : djebel Bou-Berak!..... a. *Weisei* Heyd.
- 5' — Taches jaunes basales et médianes réunies longitudinalement l'une à l'autre.
- 7 — Taches médianes et postérieures réunies à la bordure latérale (fig. 9). Se rapproche de *C. asparagi* a. *autice-conjuncta* Pic. — Algérie : Dellys!; djebel Bou-Berak!; Bône (sec. Pic) (*kabyliana* Chob.)... a. *hipponensis* Pic
- 7' — Taches médianes et postérieures non réunies à la bordure latérale (fig. 10). — Corse : Ajaccio (Guglielmi, sec. Duchaine)!. Algérie : Constantine (Bousquet)!; Bou-Berak! (*algirica* Chob.)..... a. *corsica* Pic.